

DB52

贵州省地方标准

DB 52/T 1186 —2017

黔东南小香鸡养殖技术规程

reeding technical regulations for the little sweet chickens of
Qiandongnan

2017 – 05 – 08 发布

2017 – 11 – 08 实施

贵州省质量技术监督局

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 养殖设施 1

5 饲养管理 2

6 疫病防控 4

7 出栏 5

8 养殖档案 5

9 废弃物处理 5

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由黔东南州农业科学院提出，贵州省农业委员会归口管理。

本标准起草单位：黔东南州农业科学院、黔东南州畜牧技术推广站、黔东南州质量技术监督局。

本标准主要起草人：龙明珠、盘祖香、周晓琴、胡世然、李穗榆、时宏咏、石庆楠、叶贵凯、王明鸾、李佳林。

黔东南小香鸡养殖技术规程

1 范围

本标准规定了黔东南小香鸡的养殖设施、饲养管理、疫病防控、出栏、养殖档案、废弃物处理。
本标准适用于黔东南小香鸡商品鸡养殖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 空气环境质量标准
- GB 13078 饲料卫生标准
- NY/T 388 畜禽场环境质量标准
- NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范
- NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质
- NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

黔东南小香鸡

以贵州榕江、从江、黎平为主产区，经长期自然选择而成的地方特色鸡种，列入《中国畜禽遗传资源志（家禽志）》，具有体型小、耐粗饲、耗料少、肉质嫩等特点。

3.2

全进全出制

在同一养殖区域区同时间饲养同龄的雏鸡，经过一个饲养期后，同期全部出栏的管理制度。

4 养殖设施

4.1 场址

选择植被丰富、地势高燥平坦、日照较好、距离公路主干线和村镇居民点1 km以上、周围3 km范围内无污染源，水、电、路三通的林地、果园、茶园、草场或闲田作为养殖场地。大气环境质量应符合GB 3095的规定，鸡场环境应符合NY/T 388的要求。

4.1.1 水源

有独立水源，建设贮水塔及配套供水系统。水质应符合NY 5027的规定。

4.1.2 电源

有独立专用电源，备有应急发电设备。

4.1.3 布局

生活区、生产区、兽医室、污粪尸体处理区依地势、风向分别从地势高向地势低、上风处往下风处依次排列，生产区净道、污道分开。

4.1.4 育雏舍

要求防寒、保暖、通风，布列均匀，水泥地面，配置网上育雏设备。

4.1.5 大鸡舍

4.1.5.1 永久性鸡舍要求防暑保温，向阳背风，光照充足，布列均匀，水泥地面，设置栖息网，便于卫生防疫。

4.1.5.2 简易鸡舍要求挡风、防雨、防湿，形式不拘一格。

4.2 设备和用具

常用设施和用具包括供暖、饮水、喂料、产蛋箱等。根据黔东南小香鸡的生活习性，做到简单、易行、经济、耐用。

5 饲养管理

5.1 育雏管理

指0~28日龄阶段的管理。

5.1.1 育雏准备

5.1.1.1 消毒

进雏前对育雏舍进行彻底清洗，干燥后用2%~3%的火碱溶液对育雏舍内四周、外面墙壁及地面进行消毒；然后用季铵盐类等消毒剂对舍内外进行第二次消毒；进雏前24小时用熏蒸消毒剂对舍内和育雏用具进行熏蒸消毒。

5.1.1.2 升温

在雏鸡入舍前8 h~12 h内进行育雏舍预热升温，达到35℃左右。

5.1.2 密度

饲养密度参见表1。

表1 育雏期饲养密度

周 龄	1	2	3	4
密 度（只/m²）	60~80	40~50	30~40	25~30

5.1.3 温度

第一周龄温度35℃~33℃，一周龄后每周降2℃~3℃，直至脱温。各周龄温度要求参见表2。

表2 各周龄温度要求

周 龄	1	2	3	4	4周龄后
温 度（℃）	35~33	31~28	26~23	21~18	自然温度

5.1.4 湿度

各日龄湿度要求参见表3。

表3 各日龄湿度要求

日 龄	1~10	11~28
湿 度（%）	65~70	55~70

5.1.5 光照

5.1.5.1 时间

各日龄光照时间见表4。

表4 各日龄光照要求

周 龄	1	2	3	4
小 时	23~24	20~22	16~18	自然光照

5.1.5.2 强度

强度见表5。

表5 强度

周 龄	1	2	3	4
强度（勒克斯）	20	10	10	自然光照

5.1.6 空气要求

定时通风，保持舍内空气良好。

5.1.7 饮水开食

5.1.7.1 饮水

雏鸡入舍休息30 min~60 min后，即可供给温开水，水温以25℃~30℃为宜，在水中加入5%的葡萄糖或电解多维，连饮3天。水质应符合NY 5027的规定。

5.1.7.2 开食

在雏鸡饮水2 h~3 h开食,用雏鸡料。自由采食,定时定量,少喂勤添。饲料卫生标准应符合GB 13078中的规定。

5.2 放养管理

指脱温至出栏阶段的管理。

5.2.1 放养前准备

5.2.1.1 林地围栏

根据养殖条件设置不低于200 cm~250 cm的围栏。

5.2.1.2 调教

育雏到放牧逐步进行,使鸡适应环境减少应激。采取吹口哨、敲锣、打鼓等方式,使鸡产生条件反射形成习惯性行为。

5.2.1.3 分群

按鸡的大小、强弱进行分群,舍内分区饲养,12 只/m²~15 只/m²,每个饲养区300只~500只为宜。

5.2.2 放养

5.2.2.1 放养时间

春夏早放晚归,秋冬晚放早归。

5.2.2.2 放养密度

根据养殖场地生态环境情况决定放养密度,每1亩放养50 只~80 只。

5.2.2.3 供水

每100只鸡放3个饮水器,保障充足饮水。饮水应符合NY 5027的规定。

5.2.2.4 补料

补混合料。由全价颗粒料到混合料逐步进行。脱温~60 日龄,混合料粗蛋白含量不低于17%;60 日龄~90 日龄,混合料粗蛋白含量不低于15%;90 日龄~出栏,混合料粗蛋白含量不低于13%。混合料应符合GB 13078和 NY 5032中的有关规定。

5.2.3 放养要点

分区轮牧,全进全出,防止兽害。

6 疫病防控

以预防为主,按免疫程序进行免疫。

6.1 环境消毒

- 6.1.1 鸡场入口设置消毒间、鸡舍门口设置消毒池，定期更换消毒液。
- 6.1.2 禁止外来人员、车辆入场，如需进入要严格消毒后方可入内。
- 6.1.3 工作人员进入生产区须更衣换鞋，更衣室设置消毒设施。
- 6.1.4 期对生活区和生产区道路、鸡舍及其周围环境进行消毒。

6.2 疫病防治

6.2.1 免疫程序

免疫程序参见表6。

表6 黔东南小香鸡免疫程序表

日龄	接种疫苗	预防病种	接种方法	接种剂量
1	马立克氏病活疫苗	鸡马立克（MD）	颈部皮下注射	1 羽份
7	重组禽流感灭活疫苗	禽流感（AI）	颈部皮下注射	1 羽份
12	传染性法氏囊病活疫苗	鸡传染性法氏囊病（IBD）	滴眼	1 羽份
21	新支三联 H52 活疫苗	鸡新城疫（ND） 鸡传染性支气管炎（IB）	饮水	2 羽份
25	鸡痘活疫苗	鸡痘（FP）	翼膜刺种	1 羽份
30	重组禽流感灭活疫苗	禽流感（AI）	肌肉注射	1 羽份
50	新城疫 I 系活疫苗	鸡新城疫（ND）	肌肉注射	1 羽份
80	新城疫-禽流感二联活疫苗	鸡新城疫（ND） 禽流感（AI）	肌肉注射	1 羽份

6.2.2 常见病

鸡白痢、大肠杆菌病、球虫病、蛔虫病等对病治疗，在治疗过程中药物交替使用。禽流感、新城疫、马立克、法氏囊、鸡痘、传染性支气管炎等病严格按照免疫程序进行接种。

6.2.3 兽药使用

按《兽药管理条例》规定执行，严格执行休药期。

7 出栏

实行全进全出制。出栏日龄140 日以上、健康无病。

8 养殖档案

按畜牧法中的规定建立标准养殖档案。

9 废弃物处理

设置无害化处理设施，养殖废弃物综合利用，废弃物处理要符合NY/T 1168 中的要求。

